



...το σώμα να μην αισθάνεται τον πόνο. Η αναισθησία γίνεται με την έγχυση ενός τοπικού αναισθητικού. Η διαδικασία είναι απλή και δεν απαιτείται νοσηλεία. Η διάρκεια της θεραπείας είναι περίπου 30-45 λεπτά. Η αναισθησία διαρκεί για περίπου 2-3 ώρες. Η διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί σε απόσταση 2-3 μηνών. Η μέθοδος είναι κατάλληλη για όλους τους τύπους ρυτίδων. Η μέθοδος είναι κατάλληλη για όλους τους τύπους ρυτίδων. Η μέθοδος είναι κατάλληλη για όλους τους τύπους ρυτίδων.

ΟΜΟΡΦΟ ΒΛΕΜΜΑ ΜΕ ΜΕΣΟΒΟΤΟΧ

Τι κάνουμε για τις κάθετες ρυτίδες που προεκτείνονται από το πόδι της χήνας και... διασχίζουν τα μάγουλα; Μέχρι σήμερα οι ειδικοί χρησιμοποιούσαν ενέσιμη θεραπεία με υαλουρονικό οξύ για να τις γεμίσουν. Μια νέα όμως μέθοδος που υποσχεται ακόμα καλύτερο αποτέλεσμα είναι η μεσοθεραπεία με μπότοξ (Mesobotox). Η πλαστικός χειρουργός Βίλλυ Ροδοπούλου εξηγεί: «Η θεραπεία εφαρμόζεται σε γυναίκες στις οποίες οι γραμμές έκφρασης που ξεκινούν από το πόδι της χήνας είναι κάθετες, αλλά και δίπλα στις ρινοπαραρειακές. Αυτό που διαφέρει σε αυτή τη διαδικασία σε σχέση με τις κλασικές ενέσεις βοτουλινικής τοξίνης είναι ότι τώρα αραιώνουμε αρκετά τη φαρμακευτική ουσία και εισάγουμε τις βελόνες επιφανειακά και όχι μέσα στους μύς». Σύμφωνα με τη γιατρό, αυτό συμβαίνει επειδή οι ενέσεις με τον τρόπο που γίνεται το μπότοξ δεν ενδείκνυνται στη συγκεκριμένη περιοχή, γιατί οι μύες είναι επιφανειακοί. Επομένως, αν χρησιμοποιηθούν βελόνες ενδομυϊκά, υπάρχει κίνδυνος να αλλοιωθούν τα χαρακτηριστικά μας. Αντίθετα, όταν η ουσία αραιωθεί, η δράση της δεν είναι τόσο έντονη και το πρόσωπό

μας δεν παίρνει... παγωμένη έκφραση. Το κόστος της συνεδρίας είναι περίπου € 350 (πόδι χήνας, δίπλα στις ρινοπαραρειακές, περίγραμμα προσώπου).

Πώς βελτιώνουμε το αποτέλεσμα: Μετά τη θεραπεία αποφεύγουμε την έντονη άσκηση και εφαρμόζουμε ενυδατικά καλλυντικά που περιέχουν γλυκολικό οξύ, σαλικυλικό οξύ και DMAE.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΛΑΤΕΙΩΝ

...το σώμα να μην αισθάνεται τον πόνο. Η αναισθησία γίνεται με την έγχυση ενός τοπικού αναισθητικού. Η διαδικασία είναι απλή και δεν απαιτείται νοσηλεία. Η διάρκεια της θεραπείας είναι περίπου 30-45 λεπτά. Η αναισθησία διαρκεί για περίπου 2-3 ώρες. Η διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί σε απόσταση 2-3 μηνών. Η μέθοδος είναι κατάλληλη για όλους τους τύπους ρυτίδων. Η μέθοδος είναι κατάλληλη για όλους τους τύπους ρυτίδων. Η μέθοδος είναι κατάλληλη για όλους τους τύπους ρυτίδων.

Α. Τζαμπατζής

...το σώμα να μην αισθάνεται τον πόνο. Η αναισθησία γίνεται με την έγχυση ενός τοπικού αναισθητικού. Η διαδικασία είναι απλή και δεν απαιτείται νοσηλεία. Η διάρκεια της θεραπείας είναι περίπου 30-45 λεπτά. Η αναισθησία διαρκεί για περίπου 2-3 ώρες. Η διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί σε απόσταση 2-3 μηνών. Η μέθοδος είναι κατάλληλη για όλους τους τύπους ρυτίδων. Η μέθοδος είναι κατάλληλη για όλους τους τύπους ρυτίδων. Η μέθοδος είναι κατάλληλη για όλους τους τύπους ρυτίδων.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΛΑΤΕΙΩΝ

...το σώμα να μην αισθάνεται τον πόνο. Η αναισθησία γίνεται με την έγχυση ενός τοπικού αναισθητικού. Η διαδικασία είναι απλή και δεν απαιτείται νοσηλεία. Η διάρκεια της θεραπείας είναι περίπου 30-45 λεπτά. Η αναισθησία διαρκεί για περίπου 2-3 ώρες. Η διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί σε απόσταση 2-3 μηνών. Η μέθοδος είναι κατάλληλη για όλους τους τύπους ρυτίδων. Η μέθοδος είναι κατάλληλη για όλους τους τύπους ρυτίδων. Η μέθοδος είναι κατάλληλη για όλους τους τύπους ρυτίδων.

...το σώμα να μην αισθάνεται τον πόνο. Η αναισθησία γίνεται με την έγχυση ενός τοπικού αναισθητικού. Η διαδικασία είναι απλή και δεν απαιτείται νοσηλεία. Η διάρκεια της θεραπείας είναι περίπου 30-45 λεπτά. Η αναισθησία διαρκεί για περίπου 2-3 ώρες. Η διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί σε απόσταση 2-3 μηνών. Η μέθοδος είναι κατάλληλη για όλους τους τύπους ρυτίδων. Η μέθοδος είναι κατάλληλη για όλους τους τύπους ρυτίδων. Η μέθοδος είναι κατάλληλη για όλους τους τύπους ρυτίδων.

...το σώμα να μην αισθάνεται τον πόνο. Η αναισθησία γίνεται με την έγχυση ενός τοπικού αναισθητικού. Η διαδικασία είναι απλή και δεν απαιτείται νοσηλεία. Η διάρκεια της θεραπείας είναι περίπου 30-45 λεπτά. Η αναισθησία διαρκεί για περίπου 2-3 ώρες. Η διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί σε απόσταση 2-3 μηνών. Η μέθοδος είναι κατάλληλη για όλους τους τύπους ρυτίδων. Η μέθοδος είναι κατάλληλη για όλους τους τύπους ρυτίδων. Η μέθοδος είναι κατάλληλη για όλους τους τύπους ρυτίδων.

...το σώμα να μην αισθάνεται τον πόνο. Η αναισθησία γίνεται με την έγχυση ενός τοπικού αναισθητικού. Η διαδικασία είναι απλή και δεν απαιτείται νοσηλεία. Η διάρκεια της θεραπείας είναι περίπου 30-45 λεπτά. Η αναισθησία διαρκεί για περίπου 2-3 ώρες. Η διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί σε απόσταση 2-3 μηνών. Η μέθοδος είναι κατάλληλη για όλους τους τύπους ρυτίδων. Η μέθοδος είναι κατάλληλη για όλους τους τύπους ρυτίδων. Η μέθοδος είναι κατάλληλη για όλους τους τύπους ρυτίδων.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΣΤΟ
elle.gr 